RAIVA

Animais de Produção

A raiva em bovinos, equinos, ovinos, caprinos e suínos é caracterizada por sintomas como dificuldade de deglutição, fezes secas e incoordenação motora. Muitos animais apresentam alteração de comportamento e ingestão de objetos estranhos.

Os animais infectados tendem a se afastar do rebanho, apresentam as pupilas dilatadas e os pelos eriçados. É possível observar, também, lacrimejamento, catarro nasal e movimentos anormais das extremidades posteriores. Na raiva transmitida por morcegos hematófagos, o período de incubação é geralmente mais longo, com variação de 30 a 90 dias, ou até mais. A sintomatologia predominante é da forma paralítica.

Em suínos, a enfermidade inicia-se, geralmente, com sintomas de excitabilidade. Os animais se apresentam agressivos, à semelhança do que ocorre nos cães.

Fontes: Ministério da Saúde, Instituto Pasteur e Instituto de Pesquisa Veterinária Desidério Finamor

CRMVRS
Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul
Gestão 2019/2021

O **médico veterinário** e **zootecnista** são aliados na prática da **saúde única** (atuação integrada das saúdes animal, humana e ambiental).

28 de Setembro | Dia Mundial de Combate à Raiva